

# 注意事項

すべての検診	<p>痛む部位がある等、自覚症状のある人は受診できません。速やかに医療機関を受診し、医師の診察を受けてください。</p> <p>各種けん診は、1年度1回の受診に限ります。2回以上受診した場合、2回目以降のけん診費用はご負担いただきます。（乳がん検診（マンモグラフィ）と（エコー）や、胃がん検診（エックス線）と（内視鏡）の重複受診も含まれます。）</p>
乳がん検診 (マンモグラフィ)	<p><b>&lt;次に該当する人は受診できません&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人</li><li>・授乳中もしくは断乳後半年以内の人</li><li>・脳室-腹腔シャントを入れている人</li><li>・ペースメーカーを装着している人</li><li>・前胸部静脈ポートを留置している人</li><li>・豊胸手術（シリコン等）をしている人など</li></ul> <p><b>&lt;検査を受ける際の注意&gt;</b></p> <p>乳房が張っている月経前は避けることをおすすめします。</p>
乳がん検診 (エコー)	<p><b>&lt;検査を受ける際の注意&gt;</b></p> <p>授乳中もしくは断乳半年以内の人は、受診できますが精度は下がることをご了承ください。</p>
子宮頸がん検診	<p><b>&lt;次に該当する人は受診できません&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人</li><li>・子宮全摘された人</li><li>・避妊リングを使用中の人</li><li>・現在婦人科疾患で治療・通院中の人など</li></ul> <p><b>&lt;検査を受ける際の注意&gt;</b></p> <p>月経中は受診できませんので、時期を考えてお申し込みください。</p>
大腸がん検診	<p><b>&lt;検査を受ける際の注意&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・月経中は、採便を避けてください。</li><li>・採便は、1本目をとったら翌日に2本目をとるのが理想です。2本目をとったら速やかに提出をしてください。便秘などで間があいてしまう場合は、1本目をとってから5日以内に提出してください。5日を越えてしまったときは、1本でも検査をすることはできますが、検診の精度が下がることがあります。また、提出までは涼しい場所に保管してください。</li></ul>

<p>胃がん検診 (エックス線)</p>	<p>〈次に該当する人は受診できません〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人</li> <li>・胃全摘された人</li> <li>・バリウム・発泡剤・下剤でアレルギー症状の出たことのある人</li> <li>・以前、腸閉塞になったことがある人など</li> </ul> <p>〈検査を受ける際の注意〉</p> <p>検診前日は、午後9時までに食事を済ませてください。飲水については、各検診機関の指示に従ってください。</p>
<p>胃がん検診 (内視鏡)</p>	<p>〈次に該当する人は受診できません〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人</li> <li>・呼吸不全がある人</li> <li>・急性心筋梗塞、重篤な不整脈などの心疾患がある人</li> <li>・胃全摘された人</li> <li>・その他医師が不可能と判断した人</li> </ul> <p>〈検査を受ける際の注意〉</p> <p>検診前日は、午後9時までに食事を済ませてください。飲水、その他については、医療機関の指示に従って受診してください。</p>
<p>肺がん・結核検診 (胸部エックス線)</p>	<p>〈次に該当する人は受診できません〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人</li> </ul> <p>〈検査を受ける際の注意〉</p> <p>ペースメーカーを装着している人は、事前に主治医とご相談ください。</p>
<p>肺がん検診 (喀痰細胞診)</p>	<p>〈次に該当する人は受診できません〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・痰が出ない人</li> </ul> <p>〈検査を受ける際の注意〉</p> <p>喫煙者向きの検査となりますので、たばこを吸ったことがない人は、胸部エックス線検査を受診してください。</p> <p>痰は3日間続けて採取をするのが理想です。3日目を採取したら1週間以内に提出してください。1週間を越えてしまっても検査をすることはできますが、検診の精度が落ちることがあります。また、提出するまでは涼しい場所に保管してください。</p>